

Oscillazione e continuità Hölder

Nella dimostrazione del teorema di De Giorgi abbiamo provato che l'oscillazione della soluzione decade nel passaggio da una palla grande a una più piccola. È ben noto che questa stima implica la continuità Hölder della soluzione. Infatti, si ha il seguente lemma.

Proposizione 1 (Oscillazione e continuità). *Sia $u : B_R \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione misurabile tale che:*

- (a) $\|u\|_{L^\infty(B_R)} \leq M$;
- (b) *esiste una costante $c \in (0, 1)$ tale che per ogni $x \in B_{R/2}$ ed ogni raggio $r \leq \frac{R}{4}$ si ha*

$$\operatorname{osc}_{B_r(x)} u \leq (1 - c) \operatorname{osc}_{B_{2r}(x)} u.$$

Allora, esiste una costante $\alpha \in (0, 1)$, che dipende solo da c , tale che

$$|u(x) - u(y)| \leq \frac{M}{R^\alpha} C |x - y|^\alpha \quad \text{per ogni } x, y \in B_{R/4},$$

dove C è una costante numerica.

Dimostrazione. Definiamo

$$\varphi(x, r) := \operatorname{osc}_{B_r(x)} u.$$

Allora:

- la funzione $r \mapsto \varphi(r, x)$ è crescente in r ;
- $\varphi(x, r) \leq \varphi(y, R)$, se $B_r(x) \subset B_R(y)$;
- se $0 < s < t \leq r$, allora

$$\left| \int_{B_s(x)} u - \int_{B_t(x)} u \right| \leq \varphi(r, x).$$

Definiamo

$$r_n = R2^{-n}.$$

Allora

$$\varphi(x, r_{n+1}) \leq (1 - c)\varphi(x, r_n),$$

e di conseguenza,

$$\varphi(x, r_n) \leq (1 - c)^{n-1} \varphi(x, r_1) = (1 - c)^{n-1} \varphi(x, R/2) \leq 2M(1 - c)^{n-1}.$$

Supponiamo che

$$r_{n+1} \leq r \leq r_n.$$

Allora, scegliendo $\sigma > 0$ tale che

$$2^{-\sigma} = 1 - c,$$

abbiamo

$$\varphi(x, r) \leq \varphi(x, r_n) \leq 2M(1 - c)^{n-1} \leq 2M \left(2^{-(n-1)}\right)^\sigma = \frac{2^{1+2\sigma} M}{R^\sigma} r_{n+1}^\sigma \leq \frac{2^{1+2\sigma} M}{R^\sigma} r^\sigma.$$

In conclusione, per ogni $0 < r \leq R/2$ ed ogni $x \in B_{R/2}$, abbiamo

$$\varphi(x, r) \leq \frac{2^{1+2\sigma} M}{R^\sigma} r^\sigma.$$

Come conseguenza, abbiamo che:

- ogni punto $x \in B_{R/2}$ è un punto di Lebesgue e

$$u(x) = \lim_{r \rightarrow 0} \int_{B_r(x)} u;$$

- per ogni $x, y \in B_{R/2}$ si ha

$$|u(x) - u(y)| \leq \frac{2^{1+2\sigma} M}{R^\sigma} |x - y|^\sigma.$$

□